

Fatores demográficos e clínicos associados à sífilis congênita e gestacional**Tabela suplementar 2.** Distribuição das variáveis clínicas das 153 gestantes diagnosticadas com sífilis, no Grupo de Vigilância Sanitária XXX – Jales, noroeste do estado de São Paulo, Brasil, no período de 2013 a 2017.

Dados Clínicos	2013 N %	2014 N %	2015 N %	2016 N %	2017 N %	TOTAL N %	Valor P
Trimestre gestacional							
Primeiro	4 (30,8)	11 (44,0)	9 (32,1)	4 (9,1)	11 (25,6)	39 (25,5)	0,097
Segundo	3 (23,1)	5 (20,0)	6 (21,4)	8 (18,2)	12 (27,9)	34 (22,2)	
Terceiro	3 (23,1)	7 (28,0)	7 (25,0)	16 (36,4)	9 (20,9)	42 (27,5)	
Ignorado	3 (23,1)	2 (8,0)	6 (21,4)	16 (36,4)	11 (25,6)	38 (24,8)	
Classificação clínica							
Primária	5 (38,5)	8 (32,0)	14 (50,0)	14 (31,8)	9 (20,9)	50 (32,7)	0,046
Secundária	2 (15,4)	1 (4,0)	2 (7,1)	2 (4,5)	1 (2,3)	8 (5,2)	
Terciária	2 (15,4)	7 (28,0)	4 (14,3)	2 (4,5)	8 (18,6)	23 (15,0)	
Latente	2 (15,4)	3 (12,0)	3 (10,7)	13 (29,5)	18 (41,9)	39 (25,5)	
Ignorado	2 (15,4)	6 (24,0)	5 (17,9)	13 (29,5)	7 (16,3)	33 (21,6)	
Teste Treponêmico							
Reativo	9 (69,2)	17 (68,0)	18 (64,3)	31 (70,5)	37 (86,0)	112 (73,2)	0,464
Não reativo	0 (0,0)	2 (8,0)	1 (3,6)	4 (9,1)	2 (4,7)	9 (5,9)	
Não realizado	2 (15,4)	5 (20,0)	5 (17,9)	5 (11,4)	2 (4,7)	19 (12,4)	
Ignorado	2 (15,4)	1 (4,0)	4 (14,3)	4 (9,1)	2 (4,7)	13 (8,5)	
Teste Não Treponêmico							
Reativo	1 (100,0)	22 (88,0)	26 (92,9)	31 (70,5)	39 (90,7)	131 (89,1)	0,406
Não reativo	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (3,6)	4 (9,1)	1 (2,3)	6 (4,1)	
Não realizado	0 (0,0)	3 (12,0)	1 (3,6)	3 (6,8)	2 (4,7)	9 (6,1)	
Ignorado	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (2,3)	1 (0,7)	
Parceiro tratado							
Sim	5 (38,5)	10 (40,0)	19 (67,9)	23 (52,3)	27 (62,8)	84 (54,9)	0,088
Não	5 (38,5)	13 (52,0)	6 (21,4)	10 (22,7)	12 (27,9)	46 (30,1)	
Ignorado	3 (23,0)	2 (8,0)	3 (10,7)	11 (25,0)	4 (9,3)	23 (15,0)	
Motivo para o não tratamento do parceiro							
Não teve mais contato com a gestante	2 (15,4)	3 (12,0)	3 (10,7)	3 (6,8)	4 (9,3)	15 (9,8)	0,416
Foi convocado, mas não compareceu	1 (7,7)	4 (16,0)	3 (10,7)	4 (9,1)	3 (7,0)	15 (9,8)	
Com sorologia reagente	3 (23,1)	5 (20,0)	0 (0,0)	6 (13,6)	5 (11,6)	19 (12,4)	
Outro motivo	2 (15,4)	3 (12,0)	2 (7,1)	6 (13,6)	3 (7,0)	16 (10,5)	
Ignorado	5 (38,5)	10 (40,0)	20 (71,4)	25 (56,8)	28 (65,1)	88 (57,5)	
Esquema de tratamento							
Penicilina G Benzantina 2400000UI	3 (23,1)	7 (28,0)	3 (10,7)	7 (15,9)	2 (4,7)	22 (14,6)	0,186
Penicilina G Benzantina 4800000UI	2 (15,4)	6 (24,0)	6 (21,4)	6 (13,6)	6 (14,0)	26 (17,2)	
Penicilina G Benzantina 7200000UI	7 (53,8)	10 (40,0)	18 (64,3)	26 (59,1)	34 (79,1)	95 (62,9)	
Outros	1 (7,7)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (0,7)	
Não realizado	0 (0,0)	2 (0,0)	1 (3,6)	3 (6,8)	1 (2,3)	7 (4,6)	
Fonte: do próprio autor.							