

Fatores demográficos e clínicos associados à sífilis congênita e gestacional**Tabela suplementar 3.** Distribuição das variáveis demográficas dos 55 casos de sífilis congênita, no Grupo de Vigilância Sanitária XXX – Jales, noroeste do estado de São Paulo, Brasil, no período de 2013 a 2017.

Dados demográficos	2013 N %	2014 N %	2015 N %	2016 N %	2017 N %	TOTAL N %	Valor P
Sexo	11 (20,0)	9 (16,4)	9 (16,4)	15 (27,3)	11 (20,0)	55 (100,0)	0,118
Masculino	7 (63,6)	4 (44,4)	6 (66,7)	9 (60,0)	2 (18,2)	28 (50,9)	
Feminino	4 (36,4)	5 (55,6)	3 (33,3)	6 (40,0)	9 (81,8)	27 (49,1)	
Faixa etária							0,433
0 a 6 dias	10 (90,9)	9 (100,0)	9 (100,0)	15 (100,0)	11 (100,0)	54 (98,2)	
7 a 27 dias	1 (9,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (1,8)	
Cor							0,433
Reativo	10 (90,9)	6 (66,7)	8 (88,9)	14 (93,3)	10 (90,9)	48 (87,3)	
Não reativo	1 (9,1)	2 (22,2)	0 (0,0)	1 (6,7)	1 (9,1)	5 (9,1)	
Não realizado	0 (0,0)	1 (11,1)	1 (11,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (3,6)	

Fonte: do próprio autor