

X CAIC - Congresso Anual de Iniciação Científica
XIV ECIF - Encontro Científico da FAMERP
5ª Mostra das Ligas Acadêmicas

FREQUÊNCIA DE PREMATURIDADE E DE BAIXO PESO AO NASCER EM UM HOSPITAL ESCOLA SUS

Marielle Baroni Vono¹ Márcia Aparecida dos Santos Gonçalves¹, Lígia Cosentino Junqueira Franco Spegiolin^{2,3}, Denise Cristina Mós Vaz-Oliani^{2,3}, Antonio Hélio Oliani^{2,3}, Luiz Carlos de Mattos¹, Cinara de Cássia Brandão de Mattos⁴

¹Laboratório de Imunogenética – Departamento de Biologia Molecular – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP ²Departamento de Ginecologia e Obstetrícia Oftalmologia – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP ³Ambulatório de Gestaç o de Alto Risco e Medicina Fetal – Hospital de Base – Fundaç o Faculdade Regional de Medicina de S o Jos  do Rio Preto – HB–FUNFARME;

Objetivos: Descrever as frequ ncias de prematuridade e de peso aos nascer de rec m-nascidos em um Hospital Escola de atendimento pelo Sistema  nico de Sa de (SUS). **M todos:** Esse   um estudo retrospectivo, de levantamento de dados registrados na Declara o de Nascidos Vivos (DNV) de m es atendidas no Ambulat rio de Obstetr cia do Hospital de Base, no per odo entre 2006 e 2007. Foram anotados os dados de idade materna, idade gestacional, tipo de parto, peso e sexo do RN (rec m-nascido). Os crit rios para defini o de peso ao nascer (peso normal > 2500g; baixo peso ≤ 2.499 a 1.500 g; muito baixo peso ≤ 1.499 a 1.000 g; extremo baixo peso <1000g) e prematuridade (prematuroidade extrema entre 22 a 27 semanas; prematuroidade moderada 28 a 31 semanas; prematuroidade lim trofe 32 a 36 semanas; a termo 37 a 41 semanas; p s termo ≥ 42 semanas) adotados foram os estabelecidos pela OMS. **Resultados:** Os dados dos 624 prontu rios consultados mostram: m dia de idade materna 27,2 (13-44) anos; 173 (27,7%) prim paras; 401 (64,3%) mult paras; 642 nascidos vivos incluindo 18 g meos; 240 (37,4%) masculinos e 119 (31%) femininos; 342 (54,8%) ces reas; 83 (13,3%) partos normal; 3 (0,48%) p s-termo; 279 (44,7%) a termo; 131 (21,0%) prematuroidade lim trofe; 4 (0,64%) prematuroidade moderada; 3 (0,48%) prematuroidade extrema; 329 (51,24%) normal; 91 (14,17%) baixo peso; 14 (2,19%) muito baixo peso; 5 (0,78%) extremo baixo peso. **Conclus o:** A aus ncia de dados anotados nas DNVs foi alta. A frequ ncia de 22% de RNs prematuros e de 17% com baixo peso ao nascer   alta e um importante indicador para os profissionais da sa de na promo o de medidas preventivas e educativas, uma vez que prematuroidade e baixo peso ao nascer   uma das causas de morbidade e mortalidade infantil.

Descritores: peso ao nascer, prematuroidade, baixo peso ao nascer; nascidos vivos

Financiamento: BAP-FAMERP, BIC-FAMERP, CNPq