

X CAIC - Congresso Anual de Iniciação Científica
XIV ECIF - Encontro Científico da FAMERP
5ª Mostra das Ligas Acadêmicas

HIPERMOBILIDADE ARTICULAR CORRELACIONADA À DANÇA

Ana Cristina Bassi Gianico¹

Neuseli Marino Lamari²; Juliana Thiemi Imano; Patricia Capeletto;

Ciéle Fernandes Galoro; Gisele de Souza; Isabela Sichieroli; Ricardo Botelho

1Pós-graduanda em Fisioterapia Hospitalar Geral;

2Livre Docente em Fisioterapia Profa. Adjunta do Departamento Ciências Neurológicas

Objetivo: investigar a possível correlação entre Hiper mobilidade Articular (HA) e a prática regular de dança em crianças do ensino fundamental da rede pública do Distrito III de saúde do município de São José do Rio Preto. **Método:** realizou-se um estudo prospectivo, durante um período de três meses, que avaliou 512 crianças com idades entre seis e treze anos, de ambos os sexos, pelos escores de Beighton. **Resultados:** do total de 512 crianças avaliadas, 103 fazem somente dança, 17 fazem dança e outra atividade física associada, e 392 fazem outras atividades, dessas 103 dançarinas 48 apresentaram escore de Beighton maior ou igual a 4. **Conclusão:** com base nos resultados pode-se concluir que não existe correlação significativa entre as variáveis HA correlacionada à prática regular de dança. Descritores: Diagnóstico; Instabilidade Articular; Dança; Artralgia