

**X CAIC - Congresso Anual de Iniciação Científica**  
**XIV ECIF - Encontro Científico da FAMERP**  
**5ª Mostra das Ligas Acadêmicas**

**PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE TUBERCULOSE  
NOTIFICADOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

**Milena Teixeira Pereira**

**Franciele de Nogueira Gomes, Maria de Lourdes Sperli Geraldos Santos**

Instituição: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP - São José do Rio Preto (SP), Brasil.

**Introdução:** A TB constitui problema de saúde pública no mundo, devido a abandono do tratamento, óbito e falência, além de causar danos individuais, põem em risco a saúde pública pois prolonga a infecciosidade, aumentando a probabilidade de transmissão da doença. A principal fonte de transmissão são os doentes de TB pulmonar, pelas vias aéreas. **Objetivo:** Caracterizar casos novos de TB em São José do Rio Preto, no período de 2006 á 2010, segundo as variáveis sociodemográficas: gênero, idade, escolaridade, forma clinica e desfecho de tratamento (cura, abandono e óbito). **Método:** Levantamento epidemiológico dos casos de TB do período com base nos dados da Vigilância Epidemiológica, analisados segundo gênero, idade, grau de escolaridade, forma clínica (em caso de TB pulmonar se foi realizado exame de baciloscopia e resultado), tipo de diagnóstico e desfecho. **Resultados:** Dos 586 casos notificados, 530 novos, afetando principalmente homens com 359 dos casos. A escolaridade predominante de até 7 anos de estudo e faixa etária entre 20 a 59 anos. Forma clinica predominante foi pulmonar com 403 casos sendo eles 15,4 % etilistas; 6,2% fumantes; 4% usuário de drogas; 13,4% HIV positivo; 11,7% portador de AIDS e 8,4% diabéticos; 383 baciloscopias de escarro colhidas, 296 positivas e o desfecho para a maioria desses pacientes foi a cura com 395 casos levando em conta todos as formas clinicas. **Conclusão:** Apesar dos investimentos no controle da TB, as taxas preocupam já que taxa de cura não é alcançada e a taxa de abandono do tratamento no município também é alta. Conhecer o perfil epidemiológico dos casos de TB, principalmente com relação à coleta de escarro para baciloscopia, permitiu concluir que há dificuldades em seu controle, sugerindo a necessidade de investimentos na qualificação de profissionais de saúde para o manejo da doença. **Descritores:** Tuberculose, condições sociais, atenção primária a saúde

Fomento: O Pesquisador