

X CAIC - Congresso Anual de Iniciação Científica
XIV ECIF - Encontro Científico da FAMERP
5ª Mostra das Ligas Acadêmicas

PREVALÊNCIA DE CRIANÇAS QUE DIVERTEM OS AMIGOS E SÃO HIPERMÓVEIS

Leila Beatriz Wedekin¹

Amanda Cristina Gonçalves²; Diego Dias de Castro Massi²; Juliana Thiemi Imano²; Mateus Marino Lamari²; Natalia Ancieto da Costa²; Patrícia P. de Godoy Capeletto²; Neuseli Marino Lamari³.

1. Residente Multiprofissional em Atenção ao Câncer, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), São José do Rio Preto, SP; 2. Residente Multiprofissional em Reabilitação Física, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), São José do Rio Preto, SP; 3. Professora Adjunta Doutora, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), São José do Rio Preto, SP.

Objetivos: Investigar a hipermobilidade articular e sexo em um grupo de indivíduos do ensino fundamental e estimar a prevalência de crianças que divertem os amigos e são hipermóveis. **Métodos:** A análise dos dados ocorreu no período de maio a setembro de 2013, em uma região de saúde de São José do Rio Preto, composta por 54.256 habitantes, dentre esses foram avaliadas 548 crianças do ensino fundamental da rede pública, com faixa etária de seis a 13 anos de idade, de ambos os sexos. Utilizou-se do questionário inicial investigativo para verificar se a criança apresentava características de hipermobilidade articular e do método de Escores de Beighton para classificação de crianças hipermóveis. Para análise estatística dos dados foi utilizado o Teste Exato de Fisher, onde o valor de $p < 0,05$ é significativo. **Resultados:** Do total de 548 alunos, 269 (49%) são hipermóveis, 156 (58%) são do sexo feminino e 113 (42%) do sexo masculino. Dentre os 548 alunos avaliados, 83 (15%) divertem os amigos, desses 64 (77%) são hipermóveis, sendo que no Teste Exato de Fisher = $p = 0,001$. **Conclusão:** A maioria das crianças caracterizadas como hipermóveis constitui-se de meninas, e a quantidade de crianças que divertem os amigos e são hipermóveis foi significativa. **Descritores:** Doença do colágeno, Escore, Hipermobilidade articular.