

X CAIC - Congresso Anual de Iniciação Científica
XIV ECIF - Encontro Científico da FAMERP
5ª Mostra das Ligas Acadêmicas

CARACTERIZAÇÃO DA SINDROME DE EHLERS – DANLOS TIPO III EM UMA REGIÃO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Patrícia Pereira de Godoy Capeletto

Amanda Cristina Gonçalves, Diego Dias de Castro Massi, Juliana Imano, Leila Beatriz Wedekin, Natalia Ancioto, Mateus Marino Lamari,, Neuseli Marino Lamari.

Instituição: Programa de Residência Multiprofissional - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP - São José do Rio Preto (SP), Brasil

Objetivos: Identificar a SED III em uma amostra da população de São José do Rio Preto do ensino fundamental de modo a caracterizar a amostra em relação à etnia, sexo, prática de esporte, aposição do polegar e prática de instrumento musical. **Métodos:** A análise dos dados ocorreu no período de maio à setembro de 2013 em um total de 548 alunos, com idade entre seis à 13 anos. Utilizou-se dos critérios de Brighton para caracterizar crianças com SED III. Os dados coletados foram analisados pelo programa estatístico Prisma 6.01. As variáveis categóricas foram analisadas por frequências absolutas e percentuais. **Resultados:** Do total de 548 alunos, 97 (18%) são SED III, 34 (35%) são do sexo masculino e 63 (65%) do sexo feminino. Em relação à etnia, 41 (42%) são brancos, 34 (35%) pardos, 14 (14%) negros, 2 (2%) indígenas, 2 (2%) amarelos e 4 (5%) não especificados. Dentre os síndrômicos, 16 (16%) tocam instrumentos musicais e o mais tocado entre eles são os de corda 10 (62%), 45 (46%) praticam esportes e o futebol é o mais frequente com 27 (60%) praticantes. **Conclusão:** Conclui-se na presente pesquisa que a etnia branca e o sexo feminino foram as características de maior predominância entre os alunos avaliados. Dentre os síndrômicos, o futebol é o esporte mais praticado e os instrumentos de corda os mais tocados. **Descritores:** Hiper mobilidade articular, Síndrome de Ehlers-Danlos, Doença do colágeno.