

X CAIC - Congresso Anual de Iniciação Científica
XIV ECIF - Encontro Científico da FAMERP
5ª Mostra das Ligas Acadêmicas

**CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES COM TRANSTORNOS PSICÓTICOS E
AVALIAÇÃO DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE**

Lia F. B. De Stefani

Maria Cristina O. S. Miyazaki; Sarah A. C. Neaime, Jessica P. Pupo

Academica; Docente-Orientadora

Introdução: A esquizofrenia é um transtorno psicótico maior que usualmente aparece na fase mais tardia da adolescência ou no início da idade adulta. Aproximadamente 25% destes pacientes apresentam sintomas depressivos durante o curso da doença, 10% dos pacientes cometem suicídio.

Objetivo: caracterizar e avaliar comorbidades em pacientes com diagnóstico de transtornos psicóticos atendidos no Ambulatório de Psicoses do Hospital de Base. Metodologia: A caracterização dos pacientes será realizada a partir de dados selecionados do prontuário do paciente com transtorno psicótico atendido no ambulatório de psicoses do HB-FAMERP, no período entre julho/2010 e dezembro/2012. A avaliação de comorbidades será realizada através de levantamento transversal, em amostra de conveniência composta por 12 indivíduos com transtornos psicóticos, que realizam atendimento no Ambulatório de Psicoses e possuem nível cognitivo adequado. Serão aplicados os questionários: Escala Calgary de Depressão para Esquizofrenia e a Escala de Hamilton para Ansiedade. **Resultados:** Predominaram pacientes com idade entre 35 e 54 anos (48%), do sexo masculino (67% das vítimas), solteiros (64%). Foi observado um baixo nível de escolaridade, sendo 7% analfabetos e 40% não completaram ensino fundamental, e somente 15% (considerando informação não disponível no denominador) eram economicamente ativas. Quanto a apresentação clínica do transtorno, prevaleceu a esquizofrenia, nas suas diferentes formas (71%). **Conclusão:** Transtornos psicóticos promovem grave deterioração funcional em várias esferas da vida, e demandam acompanhamento por tempo indeterminado. Quanto mais se conhecer as características destes pacientes, melhor poderá ser a abordagem no tratamento psicológico dos pacientes.