

X CAIC - Congresso Anual de Iniciação Científica
XIV ECIF - Encontro Científico da FAMERP
5ª Mostra das Ligas Acadêmicas

ESTUDO DA FUNÇÃO RENAL DO PACIENTE ONCOLÓGICO DE UM HOSPITAL DE ENSINO

Acadêmico de Enfermagem da FAMERP, Docente do Departamento de Enfermagem Geral da FAMERP, Docente do Departamento de Enfermagem Geral da FAMERP, Doutoranda pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Doutoranda em Enfermagem pela FAMERP e Enfermeira da Diálise Peritoneal do Hospital de Base e Enfermeira do Hospital de Base

Renato M. Ribeiro, Maria H. Pinto, Rita de Cássia H. M. Ribeiro, Daniela C. Bertolin, Daniele F. Ribeiro, Camilla C. Rodrigues.

O objetivo do estudo foi caracterizar os pacientes em tratamento quimioterápico no Serviço de Oncologia do Hospital de Base, no período entre os anos 2010 e 2012. Trata-se de um estudo transversal de natureza quantitativa. O estudo foi realizado em um hospital de ensino do interior paulista. O universo deste estudo foi constituído de 4.243 prontuários de pacientes adultos oncológicos, com 18 anos ou mais, atendidos no período de 2010 a 2012 e que foram submetidos a tratamento quimioterápico. Os parâmetros estudados no prontuário foram dados demográficos, como sexo, etnia, ocupação, como também exames de alteração de creatinina, alta hospitalar e óbito dos pacientes. Houve predominância dos pacientes do sexo masculino (52,65%), de etnia branca (85,1), ocupação prevalente foi “do lar” (27,17%). Quanto ao destino destes pacientes a maioria obteve alta (83,52%). O câncer de mama foi o de maior incidência (18,65%). A maioria dos pacientes não apresentou índices acima dos limites normais de creatinina, porém 34,25% apresentaram alteração renal, dentre estes 30,22% desenvolveram Lesão Renal Aguda. Os dados sugerem que há muito espaço para melhoria da qualidade assistencial na saúde e especificamente na oncologia. A avaliação clínica prévia de LRA e implicações de terapias de intervenção potenciais são descritas para diminuir as complicações da quimioterapia visando a melhora da sobrevida do paciente oncológico.