



ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS EM PACIENTES COM EPILEPSIA REFRACTÁRIA EM UM CENTRO ESPECIALIZADO: UMA ABORDAGEM DIMENSIONAL

Ana Laura de Oliveira Dias¹, Júlia Rodrigues Leandro Ulliano¹, Gerardo Maria de Araújo Filho²

¹Acadêmicas do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-FAMERP*

²Docente da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-FAMERP

Introdução: Epilepsia é um distúrbio neurológico crônico que afeta aproximadamente 1% da população mundial. Desses, 30-40% apresentam-se refratários à terapêutica medicamentosa, necessitando ser submetidas à cirurgia da epilepsia. Os transtornos psiquiátricos (TP) são muito prevalentes nesse grupo, havendo a necessidade da realização de diagnóstico de condições não presentes nos instrumentos de diagnóstico PQ convencionais. **Objetivo:** Mensurar de forma categorial e dimensional a frequência e os tipos de transtornos psiquiátricos em pacientes com epilepsia refratária, correlacionando-os a aspectos clínicos e sociodemográficos. **Métodos:** Foram aplicados os seguintes questionários de avaliação psiquiátrica dimensional a pacientes atendidos no Ambulatório de Epilepsia em Adultos do Hospital de Base (FAMERP) no período de agosto de 2013 a julho de 2014: Neurobehavioral Inventory (NBI), Interictal Dysphoric Disorder Inventory (IDDI) e o Neuropsychiatric Inventory for Depression in Epilepsy (NDDI-E). A avaliação psiquiátrica categorial foi realizada pelos critérios do Diagnostic and Statistical Manual for Psychiatric Disorders – 4th edition (DSM-IV). Os dados foram analisados estatisticamente. O valor de p considerado significativo foi de 0,05. **Resultados:** Vinte pacientes foram avaliados, dentre eles 11 mulheres (55%). A média de idade foi de 37,6±9,6 anos. Transtornos psiquiátricos (DSM-IV) foram observados em 13 pacientes (65%), sendo a Depressão (45%) e o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) (30%) os mais prevalentes. Cinco pacientes (25%) apresentaram 2 ou mais transtornos psiquiátricos. Pelo Neuropsychiatric Inventory for Depression in Epilepsy, observou-se presença de Depressão em 10 (50%), enquanto o Transtorno Disfórico Interictal foi observado em 14 pelo Interictal Dysphoric Disorder Inventory (70%). O Neurobehavioral Inventory evidenciou traços de personalidade interictal em todos os pacientes, sendo os domínios “emotividade”, “interesses cósmicos” e “crença na predestinação pessoal” os mais prevalentes. **Conclusão:** As comorbidades PQ são prevalentes em pacientes com epilepsia refratária, havendo a necessidade de estudos que realizem uma abordagem PQ dimensional, visando ao diagnóstico de transtornos psiquiátricos não presentes nos instrumentos convencionais, como o DSM-IV.

Descritores: Epilepsia, Transtornos mentais, Transtornos psicóticos

Financiamento: *Bolsista BIC/FAMERP