



CARACTERIZAÇÃO DAS PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA ATENDIDA EM UM HOSPITAL DE ENSINO

Jacqueline Fernandes de Souza¹, Maria Helena Pinto²

¹Acadêmica da 4^a. Série do Curso de Graduação em Enfermagem Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP

²Profa Dra Docente do Curso de Graduação em Enfermagem – Departamento de Enfermagem Geral. FAMERP.

Introdução: O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres nos países em desenvolvimento, e a segunda causa de morte pela doença nos países desenvolvidos. Se diagnosticado e tratado antecipadamente, o prognóstico é moderadamente bom. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. **Objetivo:** Caracterizar pacientes com câncer de mama, atendidos em um hospital de ensino de São José do Rio Preto, no período entre 2010 a 2013. **Método:** Estudo transversal, coletado de prontuários eletrônicos de pacientes diagnosticados com câncer de mama, cadastrados no Registro Hospitalar do Câncer da instituição. Utilizou-se Programa Excel (Microsoft) e correlação de Spearman para análise estatística, considerando nível de significância $p < 0,05$. **Resultados:** Analisado 557 prontuários, média de idade 56,41 anos, mediana de 55 e desvio padrão de 14,31, sendo três do sexo masculino. Todos procedente do estado de São Paulo, 81,33% branco e 50,45% ocupação do lar. Das características clínicas, 71,82% com topografia C50.9; 20,82% em estágio I da doença, seguido de 19,03% estágio IIA. Em relação ao estágio da doença com o receptor estrógeno e progesterona, 383 (68,76%) tiveram positividade do RE e 313 (56,19%) do RP, a qual 232 em estágio I e 214 em estágio IIA; 295 (52,96%) apresentaram negatividade de ambos os receptores, dentre esses 69(23,38%) no estágio I da doença. Observou-se que 203 (36,45%) apresentavam negatividade do produto oncogene (HER2) e 11% não apresentavam informações sobre RE, RP e HER-2. **Conclusão:** As características clínicas de mulheres diagnosticadas com câncer de mama, eram diagnósticos de neoplasia não especificada (C50.9), com correlação forte entre estágio da doença com a expressão do receptor estrógeno e o produto oncogene e correlação moderada entre o estágio da doença com a expressão do receptor progesterona.

Descritores: Câncer, Neoplasia e Câncer de mama

Financiamento: Bolsista BIC/FAMERP